

# MONITOR DE SÍNTOMAS

Este monitor de síntomas interactivo puede ayudarlo a realizar un seguimiento de sus síntomas. Puede completarlo y enviárselo por correo electrónico a su médico, o imprimir algunas hojas y completarlas a mano para llevarlas a su próxima cita con el médico. Si observa algunos cambios en su salud, infórmele a su médico de inmediato.

 **Entresto®**  
(sacubitril/valsartan) tablets  
24/26mg • 49/51mg • 97/103mg

FECHA: \_\_\_\_\_ *Registre sus síntomas todos los días*

 <b>PESO</b>	Pésese todas las mañanas a la misma hora. <i>Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato.</i>					_____ LB
 <b>CANSANCIO</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO	
 <b>HINCHAZÓN</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO	
 <b>TOS</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO	
 <b>FALTA DE AIRE</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO	

FECHA: \_\_\_\_\_ *Registre sus síntomas todos los días*

 <b>PESO</b>	Pésese todas las mañanas a la misma hora. <i>Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato.</i>					_____ LB
 <b>CANSANCIO</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO	
 <b>HINCHAZÓN</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO	
 <b>TOS</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO	
 <b>FALTA DE AIRE</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO	

Puede llenarlo y llevárselo a su médico en la próxima cita, junto con la Guía de diálogo con su médico, que puede descargarla en [www.ENTRESTO.com/drguide](http://www.ENTRESTO.com/drguide). Consulte los Datos importantes acerca de ENTRESTO en la última página.

# MONITOR DE SÍNTOMAS

Este monitor de síntomas interactivo puede ayudarlo a realizar un seguimiento de sus síntomas. Puede completarlo y enviárselo por correo electrónico a su médico, o imprimir algunas hojas y completarlas a mano para llevarlas a su próxima cita con el médico. Si observa algunos cambios en su salud, infórmele a su médico de inmediato.

FECHA: \_\_\_\_\_ *Registre sus síntomas todos los días*

 <b>PESO</b>	<p>Pésese todas las mañanas a la misma hora. Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato.</p> <p style="text-align: right;">_____ LB</p>				
 <b>CANSANCIO</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 <b>HINCHAZÓN</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 <b>TOS</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 <b>FALTA DE AIRE</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO

FECHA: \_\_\_\_\_ *Registre sus síntomas todos los días*

 <b>PESO</b>	<p>Pésese todas las mañanas a la misma hora. Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato.</p> <p style="text-align: right;">_____ LB</p>				
 <b>CANSANCIO</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 <b>HINCHAZÓN</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 <b>TOS</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 <b>FALTA DE AIRE</b>	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO

Puede llenarlo y llevárselo a su médico en la próxima cita, junto con la Guía de diálogo con su médico, que puede descargarla en [www.ENTRESTO.com/drguide](http://www.ENTRESTO.com/drguide). Consulte los Datos importantes acerca de ENTRESTO en la última página.

## DATOS IMPORTANTES SOBRE ENTRESTO®

### ¿Cuáles son los datos más importantes que debo saber acerca de ENTRESTO?

ENTRESTO puede dañar a su bebé en gestación o causarle la muerte. Hable con su médico sobre otras maneras de tratar la insuficiencia cardíaca si tiene planeado quedar embarazada. Si queda embarazada durante el tratamiento con ENTRESTO, infórmele a su médico de inmediato.

### ¿QUÉ ES ENTRESTO?

ENTRESTO es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con insuficiencia cardíaca de larga duración (crónica) para ayudar a reducir el riesgo de muerte y hospitalización. ENTRESTO funciona mejor cuando el corazón no puede bombear una cantidad normal de sangre al cuerpo. También se utiliza para tratar a determinados niños de 1 año o más que tienen insuficiencia cardíaca sintomática.

Se desconoce si ENTRESTO es seguro y eficaz en niños menores de 1 año.

### No tome ENTRESTO si:

- Es alérgico a algún ingrediente de ENTRESTO. Consulte el final de este folleto de Datos para Pacientes para ver una lista completa de los ingredientes de ENTRESTO.
- Ha tenido una reacción alérgica, incluida la hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta, o si ha tenido problemas para respirar al tomar un tipo de medicamento denominado inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) o bloqueador del receptor de la angiotensina II (BRA).
- Toma un medicamento inhibidor de ECA. **No tome ENTRESTO durante al menos 36 horas antes o después de tomar un medicamento inhibidor de ECA.** Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar ENTRESTO si no está seguro de que toma un medicamento inhibidor de ECA.
- Tiene diabetes y toma medicamentos que contienen aliskiren.

### Antes de tomar ENTRESTO, infórmele a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- Tiene antecedentes de angioedema hereditario.
- Tiene problemas renales o hepáticos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Consulte “¿Cuáles son los datos más importantes que debo saber acerca de ENTRESTO?”
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ENTRESTO se transmite a través de la leche materna. Usted y su médico deben decidir si tomará ENTRESTO o amamantará. No debe hacer ambas cosas.

Infórmele a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales. Usar ENTRESTO con otros medicamentos determinados puede hacer que se afecten mutuamente. Utilizar ENTRESTO con otros medicamentos puede provocar efectos secundarios graves. Especialmente, infórmele a su médico si toma: suplementos de potasio o un sustituto de sal; antiinflamatorios no esteroideos (AINE); litio; u otros medicamentos para la presión arterial alta o para problemas cardíacos como un inhibidor de ECA, BRA o aliskiren.

Conserve una lista de sus medicamentos para mostrarles a su médico y al farmacéutico cuando obtenga un nuevo medicamento.

### ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de ENTRESTO? ENTRESTO puede provocar los siguientes efectos secundarios graves:

- Consulte “¿Cuáles son los datos más importantes que debo saber acerca de ENTRESTO?”
- **Reacciones alérgicas graves que causan hinchazón en la cara, los labios, la lengua y la garganta (angioedema) que pueden provocar problemas para respirar o la muerte.** Busque ayuda médica de emergencia de inmediato si tiene síntomas de angioedema o problemas para respirar. No tome ENTRESTO de nuevo si ha tenido angioedema durante el tratamiento con ENTRESTO.
- Las personas de color que toman ENTRESTO pueden tener mayor riesgo de tener angioedema que las personas que no son de color y toman ENTRESTO.
- Las personas que han tenido angioedema antes de tomar ENTRESTO pueden tener mayor riesgo de tener angioedema que las personas que no lo han tenido antes de tomar ENTRESTO. Consulte “¿Quién no debe tomar ENTRESTO?”
- **Presión arterial baja (hipotensión).** La presión arterial baja puede ser más común si también toma diuréticos. Llame a su médico si se siente mareado o aturdido, o si desarrolla fatiga extrema.
- **Problemas en los riñones.** Su médico verificará su función renal durante el tratamiento con ENTRESTO. Si hay cambios en las pruebas de función renal, es posible que necesite una dosis más baja de ENTRESTO o que deba dejar de tomar ENTRESTO durante un tiempo.
- **Aumento de la cantidad de potasio en sangre (hiperpotasemia).** Su médico verificará su nivel de potasio en sangre durante el tratamiento con ENTRESTO.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ENTRESTO. Llame a su médico para pedir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Los efectos secundarios más comunes fueron presión arterial baja, aumento de la cantidad de potasio, tos, mareo y problemas en los riñones.

Le recomendamos que informe sobre los efectos secundarios negativos de medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

Esta información no es integral. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico, visite [www.entresto.com](http://www.entresto.com) para obtener la etiqueta del producto aprobada por la FDA o llame al 1-888-ENTRESTO.

ENTRESTO y el logotipo de ENTRESTO son marcas comerciales registradas de Novartis AG.

